

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЕСНОГО ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ

Борисова Т.С., Кушнерук А.В., Самохина Н.В.

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск, Республика Беларусь



С целью оценки содержания телесного жира проведена биоимпедансометрия 394 учащихся 7-11 лет учреждения общего среднего образования г.Минска.




Рисунок 1 - Распределение детей в возрасте 7-11 лет в зависимости от уровня содержания телесного жира




Рисунок 2 - Распределение обследованных детей в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий




Рисунок 3 - Распределение обследованных детей в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий




Рисунок 4 - Распределение детей 7 лет в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий




Рисунок 5 - Распределение детей 8 лет в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий




Рисунок 6 - Распределение детей 9 лет в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий




Рисунок 7 - Распределение детей 10 лет в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий




Рисунок 8 - Распределение детей 11 лет в зависимости от уровня содержания телесного жира с учетом половых различий

Нормальное содержание телесного жира характерно для трети детей 7-11 лет. При этом, выявлены различия содержания телесного жира в зависимости от возраста и пола.