

КУРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИЕЙ

Мартинков В.Н., Новик Д.К., Силин А.Е. ✉ martinkov@rcrm.by

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», Гомель, Республика Беларусь

АКТУАЛЬНОСТЬ

Тромбозы - распространенные осложнения при эссенциальной тромбоцитемии ЭТ (19-32%). Курение – один из факторов риска тромбозов при ЭТ (IPSET-thrombosis). Курение – экзогенный фактор, который можно устранить при отказе от курения

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ

Оценить связь курения и тромбозов в группе из 174 пациентов с ЭТ

- Медиана возраста – 60,5 лет;
- Статобработка: χ^2 , Kaplan-Meier




Рис.1 Доля курящих и медиана возраста пациентов с ЭТ




Рис.2 Частоты в зависимости от пола




Рис.3 Частоты тромбозов при ЭТ




Рис.4 Повышенные гемоглобин и гематокрит у курящих с ЭТ




Рис.5 Выживаемость без тромбозов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Курящих при ЭТ – 12,1%.
- Курение связано с мужским полом.
- Не выявлено значимого увеличения риска тромбозов у курящих при ЭТ.
- Частота артериальных тромбозов в 1,7 раз больше среди курящих с ЭТ, ($p=0,295$), важна их профилактика у курящих.
- У курящих с ЭТ чаще повышены гематокрит и уровень гемоглобина, что может быть связано с полом курящих